

Impacto del consumo de drogas de uso recreativo en variables relacionadas con la salud en personas con VIH

V Castro^{1,2}, L Leal³, N Garin⁴, JL Casado⁵, S Cenoz⁶, A Jaén⁷, MJ Galindo⁸, **MJ Fuster-Ruiz de Apodaca⁹**

¹H. Comarcal de la Marina Baixa, Villajoyosa, ² Programa de Farmacia de la Universidad de Granada, ³Hospital Clínico, Barcelona ⁴Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona ⁵Hospital Ramón y Cajal, Madrid ⁶ViiV Healthcare, Madrid, ⁷Fundació Recerca i Docència Mutua Terrassa, Barcelona, ⁸H. Clínico, València, ⁹SEISIDA, Madrid



8 de Noviembre 2018

DISEÑO INVESTIGACIÓN

Estudio 1
CUALITATIVO

Identificación de dominios relevantes a explorar
Diseño de Encuesta

N = 21

Estudio 2
CUANTITATIVO
Encuesta transversal

Análisis de la prevalencia de uso recreativo de drogas y otros medicamentos en personas con VIH

Análisis de las estrategias de manejo de las interacciones en PVIH y del impacto de las drogas en la calidad de vida

N = 1401

Estudio 3
OBSERVACIONAL TRANSVERSAL Y DE COHORTES RETROSPECTIVAS

Repercusión clínica del uso de drogas y de las interacciones

Implicaciones económicas del uso de drogas y de las interacciones

N = 276

Diseño mixto exploratorio secuencial



DISEÑO INVESTIGACIÓN

Se presentan en esta comunicación los datos de la encuesta transversal que analiza el impacto del uso de drogas en variables relacionadas con la salud medidas con PROs:

- ✓ Adherencia al TAR (CEAT-VIH)
- ✓ Calidad de vida (WHOQOL-HIV-BREF)
- ✓ Bienestar psicológico (GHQ-12)
- ✓ ITS padecidas en el último año
- ✓ Uso recursos sanitarios

Estudio 3
OBSERVACIONAL TRANSVERSAL Y DE COHORTES RETROSPECTIVAS

Repercusión clínica del uso de drogas y de las interacciones


Implicaciones económicas del uso de drogas y de las interacciones

N = 276


Diseño mixto exploratorio secuencial

METODOLOGÍA

Estudio observacional de cohortes retrospectivo multicéntrico (4 hospitales*)




CRITERIOS DE SELECCIÓN/EXCLUSIÓN DE LOS PACIENTES:



* H. Comarcal Marina Baixa, H. Clínico BCN, H. Sant Pau, H. Ramón y Cajal.

PARTICIPANTES

Más jóvenes (41 vs. 48 años, $p < .0001$)
 Más HSH (92% vs. 75%, $p < .0001$)
 Sin relación estable (66% vs. 53%, $p < .05$)
 Más empleados (74% vs. 56%, $p < .0001$)
 Menos tiempo de diagnóstico (11 vs 14 años aprox, $p < .01$)



RESULTADOS

Uso drogas

- ✓ Prevalencia: poppers (80.8%), cocaína (69.9%), cannabis (62.3%) y GHB (55.5%).
- ✓ Frecuencia: 5.3 ± 3.2 (rango 1-14)

Interacciones

- ✓ Interacciones potenciales en 53.2% pacientes (40.3% moderadas)
- ✓ 301 potenciales interacciones moderadas en dichos pacientes
- ✓ IPs droga-paciente más frecuentes: cocaína (42%), cannabis (29%), ketamina (17.5%), GHB (17%), MDMA (15%)

ITS y PROs

- ✓ Mayor prevalencia ITS en consumidores (48.6% vs. 16.9%). ITS más frecuentes: sífilis (36.3% vs. 10%) y gonorrea (15% vs. 1.5%)
- ✓ Menor adherencia TAR en consumidores ($M = 87.8$ vs. 90.6; $p < .001$)
- ✓ Menor calidad de vida en consumidores ($M = 71.5$ vs. 77.9; $p < .0001$)
- ✓ Más ansiedad (1.93 vs. 1.78; $p < .01$) y depresión (2 vs. 2.2; $p < .01$) en consumidores

R.Sanitarios

- ✓ Mayor uso de servicio urgencias en consumidores (46.6% vs. 31.5%)
- ✓ Mayor nº ingresos hospitalarios en consumidores (15.1% vs. 7.7%)



CONCLUSIONES

- ✓ El consumo de drogas recreativas tiene un impacto negativo en variables relacionadas con la salud de personas con VIH, incluyendo variables clínicas, de calidad de vida y bienestar psicológico, así como un mayor consumo en los recursos sanitarios.
- ✓ Estos resultados recogidos con medidas auto-reportadas están siendo analizados junto con datos recogidos a través de historias clínicas.
- ✓ Deberían ponerse en marcha intervenciones para dar respuesta al uso problemático del uso de drogas y así mejorar los resultados en salud de las personas con VIH

GRACIAS POR SU ATENCIÓN